

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 29 aprile 2026

Vite: Le piogge di ieri e questa notte hanno apportato poco meno di 20 mm e sono da considerare predisponenti per l'infezione primaria di peronospora. Se non è ancora stato fatto, si consiglia di intervenire quanto prima e non oltre i primi di maggio con Valis F, Pergado R, Mildicut con aggiunta di rame ecc., Chi ha già eseguito il primo intervento, allo scadere della persistenza deve eseguire il secondo, possibilmente con un sistemico come Ridomil gold con folpet, Actlet F ecc.. Vedere il Notiziario tecnico per ulteriori indicazioni.

Aggiungere zolfo bagnabile o liquido a 250-300 g/ml per ettolitro, ed eventualmente un sistemico come Prosper, che lavora bene a basse temperature, oppure Domark o Galileo se si alzano le temperature.

Per i **biologici** è consigliato trattare preventivamente prima delle piogge, con rame e zolfo. Possibile l'aggiunta di un induttore di resistenza come Romeo.

Melo: le piogge di ieri e di questa notte hanno determinato condizioni favorevoli a infezioni di ticchiolatura, e poco meno di 20 mm di dilavamento complessivo. **Attenzione, sono da tenere in considerazione anche i dilavamenti dei turni di irrigazione, a seconda delle zone.** Considerando solo la pioggia, chi non aveva effettuato trattamenti per la ticchiolatura o ha trattato prima di domenica, deve intervenire entro venerdì sera con un sistemico come Score o Revysion in miscela con Dithianon o altro coprente; chi aveva trattato domenica ha un po'

più di copertura ma ha comunque la vegetazione parzialmente scoperta e dovrebbe comunque intervenire con i medesimi prodotti, eventualmente anche entro sabato mattina. Chi ha trattato lunedì, per ora ha la vegetazione coperta; se oggi la vegetazione asciuga può ritenersi coperto, altrimenti deve intervenire sempre con sistemico e coprente; verranno date ulteriori indicazioni; a chi non ha ancora eseguito il trattamento aficida postfiorale si consiglia di effettuare, con tempo stabile, Teppeki o Pirimor, o Sivanto o Closer. Per ulteriori indicazioni vedere il Notiziario tecnico.