

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954

- in orario ufficio: alla risposta digitare 3

- fuori orario ufficio: ascolto diretto

## I voli della Carpocapsa sono iniziati

La scorsa settimana si sono osservate nei frutteti del conoide di Ponte in Valtellina le prime catture di adulti di Carpocapsa con le trappole traptest. Le sommatorie termiche vanno da circa 180 gradi giorno dei frutteti dell'alta valle (stazione Cologna) ai circa 220 gradi giorno di Ponte in Valtellina. Ci troviamo pertanto all'inizio del volo, con qualche giorno di anticipo rispetto al 2025. Si consiglia, aspettando che ci sia una finestra di bel tempo, di effettuare un intervento con prodotti ovo-larvicidi, **indicativamente entro la fine di questa settimana nelle zone precoci**, mentre è possibile aspettare qualche giorno in più (**inizio-metà di quella successiva, indicativamente entro il 20-22 del mese**) nelle zone tardive e quelle a quote più alte (alta valle). In questa fase sono consigliati clorantropoli (Coragen, Voliam), oppure tebufenozide (Mimic ecc.), unico vero e proprio regolatore di crescita (MAC, acceleratore della muta), tutti consentiti anche dai Disciplinari di produzione integrata.

Per le **strategie biologiche**, si consiglia di intervenire sempre con tempo stabile utilizzando formulati a base di virus della granulosa (Madex), che deve essere presente sulla vegetazione prima della fuoriuscita delle larve (va ripetuto per 3-4 trattamenti complessivi a distanza di circa 8 giorni) ed eventualmente applicare i diffusori del disorientamento a partire da metà-fine giugno. Aspettando qualche giorno in più si consiglia invece di effettuare un insetticida a base di spinosad (Laser).

**Ticchiolatura:** cautelativamente si consiglia di trattare le infezioni a seguito delle piogge di questa settimana, ancora come infezioni primarie, quindi con trattamenti preventivi a base di formulati contenenti dithianon o fluazinam, oppure in mancanza di copertura, con interventi curativi sempre utilizzando i medesimi prodotti, ma in miscela con sistemici quali Score 25 EC (difenoconazolo) o mefentrifluconazolo (Revysion) entro 72-max 96 ore dall'inizio della pioggia. In alternativa si possono utilizzare anche fluopyram+tebuconazolo (Luna experience), oppure fluxapyroxad (Sercadis SC), registrato su ticchiolatura e

oidio, con intervallo di 7-10 giorni tra i trattamenti (max 3 interventi), o penthiopyrad (Fontelis), registrato contro ticchiolatura, oidio e alternaria con intervallo di 7 giorni tra le applicazioni (max 2 interventi). Tra penthiopyrad, fluxapyroxad e fluopyram massimo 4 interventi a stagione per le aziende che aderiscono ai Disciplinari di produzione integrata.

*Fondazione Fojanini di Studi Superiori, 11 maggio 2026*