

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 9 giugno 2026

Vite: In questa fase, tra acini grano di pepe e ingrossamento acini-prechiusura grappolo si consiglia di usare per la **peronospora** un prodotto come Ampexio, Pergado F, Pergado R, oppure Mildicut o altro prodotto a base ciazofamide con aggiunta di rame. Rispettare attentamente gli intervalli tra gli interventi indicati in etichetta, adottando quelli più brevi in caso di maltempo e forte dilavamento. In caso di comparsa di sintomi di peronospora su foglie o grappoli si consiglia l'aggiunta di cimoxanil.

Per l'**oidio**, aggiungere zolfo bagnabile o liquido a 300-350 g/ml per ettolitro, con Vivando o simili, Kusabi o Cidely-Rebel top.

Tignoletta: mediamente la situazione è sotto controllo, è stata segnalata presenza di nidi di tignoletta in qualche zona dove si era già vista presenza lo scorso anno; si attende la ripresa della seconda generazione per valutare più attentamente la situazione.

Trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata:

sono state pubblicate le date per i trattamenti insetticidi obbligatori: il primo trattamento va effettuato **dal 2 al 14 giugno**. Per il primo intervento sono consigliati acetamiprid (Epik, Kestrel), oppure flupyradifurone (Sivanto prime). Possibile eventualmente anche l'utilizzo di altri formulati registrati.

Per i biologici, obbligatori tre trattamenti; il primo deve essere effettuato dal 2 al 14 giugno, i successivi ogni 10-14 giorni. Consigliato piretro o uno degli altri formulati ammessi nel bio e registrati contro l'avversità. Si rimanda al bollettino specifico per ulteriori informazioni.

Attenzione: SONO VIETATI TRATTAMENTI INSETTICIDI IN FIORITURA. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest'ultima venga preventivamente sfalciata.

Melo: in questo periodo si consiglia di rinnovare i trattamenti **fungicidi** preventivi di copertura, da ripetere dopo piogge particolarmente dilavanti (50-60 mm), e in funzione della presenza o meno di malattia. In caso di presenza di infezioni di ticchiolatura si consiglia un trattamento con dodina, che ha azione bloccante. In assenza di macchie si possono usare coprenti come Delan o altri prodotti a base dithianon, fluazinam (Banjo, Nando ecc.), oppure Flint. A breve si può iniziare ad utilizzare un prodotto a base di captano. Contro l'oidio si consiglia zolfo bagnabile o liquido.

La presenza di **afide lanigero** è invece molto abbondante, e non si vede ancora parassitizzazione. Con forte presenza si consiglia un intervento con Pirimor o Aphox in miscela con bagnante, oppure Sali potassici di acidi grassi (es. Flipper) oppure Movento, consentito anche quest'anno con registrazione di emergenza.

In questo periodo le catture di **carpocapsa** sono molto basse e non sono necessari ulteriori interventi, tranne che nei frutteti a conduzione biologica dove si effettuano trattamenti con granulovirus circa ogni 8-10 giorni. A seconda dell'andamento delle catture di seconda generazione, verso fine mese si valuterà la necessità di un intervento insetticida. Da metà mese è possibile eventualmente l'applicazione dei diffusori Ecodian del disorientamento. Attenzione, ci sono segnalazioni di presenza di giovani di **cimice asiatica**, con anticipo rispetto alle scorse annate. Effettuare controlli e confrontarsi con un tecnico prima di decidere un eventuale trattamento.