

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 23 giugno 2026

Vite: In questa fase, tra ingrossamento acini-prechiusura grappolo si consiglia di usare per la **peronospora** un prodotto come Ampexio, Pergado R, Pergado SC più rame, oppure Mildicut o altro prodotto a base ciazofamide con aggiunta di rame, oppure Electis R. In alternativa si possono usare come coprenti anche Nando maxi o Banjo. Rispettare attentamente gli intervalli tra gli interventi indicati in etichetta, adottando quelli più brevi in caso di maltempo e forte dilavamento. In caso di comparsa di sintomi di peronospora su foglie o grappoli si consiglia l'aggiunta di cimoxanyl.

Per l'**oidio**, aggiungere zolfo bagnabile o liquido a 300-350 g/ml per ettolitro, con Vivando o simili, Kusabi o Cidely-Rebel top. **Attenzione, con questo andamento meteo caldo afoso il rischio di infezioni di oidio è in aumento!**

Tignoletta: si osserva già da una decina di giorni l'inizio del secondo volo della tignoletta, con catture soprattutto nel mandamento di Morbegno e in alcune zone della Sassella fuori confusione. Per il momento non vanno effettuati trattamenti specifici. Limitarsi a effettuare quelli contro lo *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata: **il secondo trattamento va eseguito dal 17 al 29 giugno** con prodotti come Trebon, Mavrik ecc. Possibile eventualmente anche l'utilizzo di altri formulati registrati.

Per i biologici, obbligatori tre trattamenti; dopo il primo eseguito dal 2 al 14 giugno, i successivi devono essere fatti ogni 10-14 giorni. Consigliato piretro o uno degli altri formulati ammessi nel bio e registrati contro l'avversità. Si rimanda al bollettino specifico per ulteriori informazioni.

Attenzione: sono vietati trattamenti insetticidi in fioritura e quando è in fioritura la vegetazione sottostante, in questo caso occorre preventivamente sfalciare.

Melo: in questo periodo si consiglia di rinnovare i trattamenti **fungicidi** preventivi di copertura, da ripetere dopo piogge particolarmente dilavanti (50-60 mm), e in funzione della presenza o meno di malattia. In caso di presenza di infezioni di ticchiolatura si consiglia un trattamento con dodina, che ha azione bloccante. Attenersi alle indicazioni dei referenti che ritirano e commercializzano la frutta, per i prodotti da utilizzare. In caso di utilizzo di Captano, attenzione a non usare zolfi, e distanziarli comunque di almeno 7 - 10 giorni per evitare problemi di fitotossicità. I trattamenti con zolfo andrebbero evitati quando le temperature superano i 28° C per evitare bruciature. **Attenzione ai tempi di carenza sulle Gala.**

La presenza di **afide lanigero** è in qualche caso molto abbondante. Con forte presenza e assenza di parassitizzazione si consiglia un intervento con Pirimor o Aphox in miscela con bagnante, oppure sali potassici di acidi grassi (es. Flipper) oppure Movento, consentito anche quest'anno con registrazione di emergenza.

Carpocapsa: per ora le catture sono basse, si consiglia di attendere indicativamente fine mese per ripetere un intervento con Coragen o Affirm. È possibile eventualmente a partire da questi giorni l'applicazione dei diffusori Ecodian del disorientamento. Attenzione, ci sono segnalazioni di presenza di adulti e stadi giovanili di **cimice asiatica**. I trattamenti sono di difficile applicazione per quanto riguarda le tempistiche; nel caso ce ne fosse bisogno, e soprattutto dove c'erano danni importanti gli anni scorsi, si può pensare anche in modo localizzato, sui bordi dei frutteti ecc., ad un intervento con un piretroide abbattente come Trebon, Mavrik ecc. È importante che le aziende facciano dei controlli frequenti.

Anche in questo caso nella scelta delle molecole attenersi alle indicazioni di chi ritira la frutta per evitare residui indesiderati.