

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 6 agosto 2026

Vite: con questo andamento meteo si possono allungare gli intervalli tra i trattamenti; in questa fase si consigliano solo prodotti a base di rame (ossicloruro, idrossido o solfato) e zolfo a dosi minime di etichetta, dopo 18-20 giorni dal trattamento precedente, oppure dopo un dilavamento consistente a seguito di temporali ecc.

Non si rendono necessari interventi insetticidi.

Aggiungere eventualmente un concime fogliare a base di calcio.

Melo: rinnovare i trattamenti **fungicidi** di copertura, da ripetere dopo piogge particolarmente dilavanti (50-60 mm) o irrigazioni sovrachioma. Attenersi alle indicazioni dei referenti che ritirano e commercializzano la frutta, per i prodotti da utilizzare. **Attenzione ai tempi di carenza sulle Gala.**

Carpocapsa: al momento non si rendono necessari interventi.

Cimice asiatica: nel caso ce ne fosse bisogno, e soprattutto dove c'erano danni importanti gli anni scorsi, si può pensare, ad un intervento anche in modo localizzato sui bordi dei frutteti ecc., con un piretroide abbattente come Trebon, Decis ecc. E' importante che le aziende facciano dei controlli frequenti. Anche in questo caso nella scelta delle molecole attenersi

alle indicazioni di chi ritira la frutta per evitare residui indesiderati. NON SI CONSIGLIANO TRATTAMENTI INSETTICIDI SULLE GALA.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura.