

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 26 agosto 2026

Vite: Visto il cambiamento delle condizioni meteo e le forti precipitazioni della settimana scorsa, si consiglia di ripetere una copertura con rame, e l'antibotritico eventualmente anche solo in fascia grappolo. L'antibotritico quest'anno non va ritardato troppo, visto l'andamento meteo e della maturazione, in base ai tempi di carenza. Per il tipo di prodotto fare riferimento alle indicazioni di chi ritira le uve, e al Notiziario tecnico n° 14 del 7 agosto. Aggiungere eventualmente un concime fogliare a base di calcio, verificando la compatibilità con i prodotti.

Melo: rinnovare i trattamenti **fungicidi** di copertura, da ripetere dopo piogge particolarmente dilavanti (50-60 mm) o irrigazioni sovrachioma. Attenersi alle indicazioni dei referenti che ritirano e commercializzano la frutta, per i prodotti da utilizzare e in base ai tempi di carenza.

Carpocapsa: al momento non si rendono necessari interventi.

Cimice asiatica: le popolazioni di cimice asiatica e in qualche caso anche di cimice verde sono in aumento da circa 10 giorni; **su Golden e varietà rosse viste in prospettiva delle tempistiche di raccolta non si consigliano particolari interventi**, se non nelle zone tardive e in quota. Si consiglia di effettuare gli sfalci, che possono aiutare nella difesa contro la cimice. Maggiore attenzione va posta alle varietà molto tardive come Fuji e Pink lady o simili, che

normalmente vengono maggiormente attaccate dalle cimici; dovendo trattare si può valutare se intervenire su tutta la superficie o effettuare un intervento anche in modo localizzato solo sui bordi dei frutteti con un piretroide abbattente come Trebon o Decis jet, con 7 giorni di carenza. Anche in questo caso nella scelta delle molecole attenersi alle indicazioni di chi ritira la frutta per evitare residui indesiderati.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura.