

# Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



FONDAZIONE  
FOJANINI  
DI STUDI  
SUPERIORI

Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 512958 - 0342 513449  
[www.fondazionefojanini.it](http://www.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di giovedì 30 maggio 2019

**Melo:** Le infezioni primarie di **ticchiolatura** sono ormai al termine, anche perché il potenziale di spore è ormai in esaurimento. Si consiglia in questo periodo di rinnovare le coperture con Banjo o Nando, oppure Fontelis o Sercadis, trattando a cadenza di 8-10 giorni, a seconda dei dilavamenti. In assenza di infezioni si può usare anche Flint. Aggiungere zolfo bagnabile o liquido per l'oidio solo se si usa Banjo o Nando.

I modelli previsionali e le catture in alcuni frutteti indicano che il volo della **Carpocapsa** è iniziato ormai da più di una settimana, e in base alle tempistiche siamo in presenza di prime ovideposizioni. Effettuare il trattamento insetticida entro la prossima settimana, con temperature in rialzo. Prodotti consigliati: Coragen, oppure è ancora possibile usare un ovolarvicida come Mimic o in alternativa Prodigy.

**Vite:** le precipitazioni dei giorni scorsi hanno apportato circa 30 mm di acqua, pertanto sono state discretamente dilavanti. Inoltre sono state segnalate macchie sporadiche di peronospora in alcuni vigneti. Si consiglia, in previsione delle piogge di metà settimana prossima, di rinnovare le coperture dopo 12-14 giorni se si è usato un sistemico, dopo 10 giorni se si è usato un citotropico come Forum o Acrobat. Prodotti utilizzabili in questo periodo: sistemici come Ridomil con mancozeb o con folpet, Electis trio, Zorvec Zelavin. Questo è l'ultimo anno di utilizzo di R6 trevi.

Attenzione: si osserva la presenza di **Black rot** in alcuni vigneti; in questi casi usare un prodotto antiperonosporico contenente mancozeb o metiram, oppure un antioidico come Score o Thiocur, oppure Flint o Quadris.

Per l'oidio si possono usare Topas, oppure Scudex o Thiocur forte o Domark in miscela con zolfo bagnabile o liquido a dosaggi di 250-350 g-ml/hl. Questo è l'ultimo anno di utilizzo di Arius.

Per i trattamenti nel biologico attenzione a non allungare troppo i turni, in ragione dei dilavamenti dei giorni scorsi. Per altre indicazioni vedere i Notiziari tecnici inviati.