

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di martedì 25 giugno 2019

**Melo:** intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 12-14 giorni dal trattamento precedente, in particolare dove sono attivi gli impianti di irrigazione; negli altri casi si possono allungare ulteriormente i turni di intervento in quanto non sono previste precipitazioni a breve. Usare Flint con aggiunta di 40-50 g/hl di Delan, oppure Captano. In presenza di infezioni in atto non ben controllate utilizzare Dodina oppure Delan con l'aggiunta di un sistemico ed eventualmente Thiopron. Non usare Flint in presenza di infezioni. Aggiungere calcio per la butteratura. Nei frutteti dove non si applica la confusione sessuale, se si sono visti segni di bacato facendo le operazioni di dirado manuale è il caso di effettuare un trattamento abbattente con Affirm oppure clorpirifos metile. Nei frutteti sottoposti a confusione mediante i gancetti del disorientamento è arrivato il momento di applicare i diffusori.

**Vite:** in questa fase l'accrescimento vegetativo è notevole e richiede la massima attenzione sia per la difesa antiperonosporica che per quella antioidica. Sono state segnalate da circa una settimana macchie su femminelle; in questa fase si possono usare prodotti citotropici contenenti dimetomorph come Forum R, oppure Mildicut con aggiunta di rame, o Presidium one sempre con aggiunta di rame o in alternativa Agron o Electis R. In presenza di infezioni accorciare i turni di intervento, usando Forum R oppure un prodotto a base di cimoxanyl puro con aggiunta di rame, oppure Reboot che contiene zoxamide e cimoxanyl. Per l'oidio utilizzare Arius (ultimo anno di utilizzo), oppure Vivando o Kusabi, o Flint con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido.

Effettuare il primo trattamento insetticida contro lo *Scaphoideus titanus* nei vigneti della bassa valle fino a Sondrio, entro fine mese. Nelle zone con obbligo di trattamento unico intervenire **dal 23 giugno al 7 luglio**.

Per i prodotti utilizzabili consultare il Notiziario tecnico.