

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 2 agosto 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, stando attenti ai dilavamenti. Usare Flint (14 giorni di carenza) oppure Captano (21 giorni di carenza). **Non si può più utilizzare Captano sulle Gala.** Nei frutteti non controllati con la confusione sessuale, se non si è trattato nelle scorse settimane per la **Carpocapsa** con Prodigy o Coragen, si consiglia di intervenire con Calypso, oppure un prodotto a base di fosmet (Spada ecc.) o clorpirifos metile. I prodotti sono efficaci anche contro la cimice asiatica. Non si possono più utilizzare fosmet e clorpirifos metile su Gala, eventualmente usare Affirm. Attenzione alla **cimice asiatica**, in caso di presenza si possono effettuare trattamenti sui bordi e nelle situazioni più critiche dopo aver sentito il parere del servizio tecnico di riferimento.

Vite: La **peronospora** presenta un buon contenimento; in questa fase si consiglia di usare un formulato a base di rame (Airone, Coprantol, Poltiglia Disperss ecc), o se si vuole una maggiore persistenza, Electis R. Per l'**oidio** usare solo zolfo bagnabile o liquido a 200-250 g-ml/hl facendo più attenzione alle vigne che hanno subito forti attacchi nelle settimane precedenti. In caso di attacchi forti di oidio effettuare due interventi ravvicinati con zolfo, preferibilmente liquido, ad alto dosaggio.

Nella zona di Buglio Villapinta ci sono catture molto alte di tignoletta, verranno forniti ulteriori aggiornamenti e indicazioni per interventi insetticidi in base ai monitoraggi.