

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 13 agosto 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, stando attenti ai dilavamenti. Usare Captano (21 giorni di carenza) o Bellis (7 giorni di carenza). **Non trattare più la Gala, se non nelle zone più tardive, esclusivamente con Bellis o Geoxe (3 giorni di carenza) e non oltre questa settimana.**

Attenzione: effettuare controlli sulle mele per verificare eventuali attacchi di Carpocapsa; si segnalano danni con penetrazioni abbastanza fresche, specialmente in alcuni frutteti a conduzione BIO. In caso di attacchi usare Success o Laser (7 giorni di carenza); sul convenzionale si può usare anche Affirm (7 giorni carenza) o Calypso (14 giorni); attenzione se si deve trattare la Gala farlo solo nelle situazioni più tardive e non oltre questa settimana perché ormai siamo prossimi alla raccolta.

Utilizzare un prodotto a base di calcio cloruro per la butteratura

Vite: la situazione fitosanitaria è buona, in questi giorni è opportuno rinnovare le coperture dopo 20-30 mm di dilavamento, o in alternativa mediamente ogni 15-18 giorni, con prodotti a base di Rame (Airone, Coprantol, Poltiglia disperss ecc.) ed

eventualmente un'aggiunta di zolfo bagnabile o liquido a dosi limitate nelle zone più tardive. Dove l'invasatura è più avanti, sospendere gli zolfi. Solo nelle zone più precoci e in caso di vitigni sensibili o cloni di Nebbiolo chiusi è opportuno effettuare nei prossimi giorni un primo trattamento antibotritico. Fare riferimento all'ultimo Notiziario tecnico emanato. Eventualmente si può aggiungere un concime fogliare a base di potassio per favorire la maturazione.