

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 27 agosto 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture per la ticchiolatura, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, stando attenti ai dilavamenti. Usare Captano (21 giorni di carenza) o Bellis (7 giorni di carenza).

Attenzione: si segnala una presenza preoccupante di cimice asiatica sulle mele soprattutto negli stadi giovanili, e si riscontrano anche danni; si consiglia di effettuare controlli, e in caso di rinvenimento di numeri elevati di cimice e/o di danni, intervenire con un insetticida; si può usare Epik, (14 giorni di carenza), oppure Calypso (14 giorni), clorpirifos metile (21 giorni), Trebon (7 giorni) o eventualmente sfruttare l'effetto collaterale di Affirm (7 giorni di carenza); Utilizzare un prodotto a base di calcio cloruro per la butteratura

Vite: la situazione fitosanitaria è buona, le piogge degli ultimi 15-20 giorni però hanno determinato un notevole dilavamento, e la sanità delle femminelle ne ha risentito. Si consiglia però di non esagerare con le cimature perché determinano emissione di nuove femminelle che non faranno in tempo ad essere pronte per tempo per l'attività fotosintetica; si consiglia di ripetere il trattamento per garantire la sanità delle foglie, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, usando

esclusivamente un prodotto ramato (ossicloruro, idrossido o solfato); si consiglia di non aggiungere più zolfo; eventualmente, specialmente nei vigneti della bassa valle colpiti da grandine, si può aggiungere un prodotto a base di zeolite, argille acide che favoriscono l'asciugatura. Mediamente si consiglia di posizionare l'antibotritico, valutando o meno l'opportunità di usarlo, a seconda della sanità delle uve e dei fattori predisponenti, intorno alla prima decade di settembre.