

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 9 settembre 2019

Melo: intervenire rinnovando le coperture, dopo 15-18 giorni dal trattamento precedente, stando attenti ai dilavamenti. Usare Bellis (7 giorni di carenza) o Geoxe (3 giorni) su Golden e Rosse. Sulle varietà tardive si può usare ancora Captano (Merpan 80 WDG ecc.). Attenzione alla deriva sulle Renette in fase di raccolta.

Attenzione alla presenza della cimice asiatica nei meleti; si segnala una presenza preoccupante sulle mele soprattutto negli stadi giovanili, e si riscontrano anche danni; si consiglia di effettuare controlli, e in caso di rinvenimento di numeri elevati di cimice e/o di danni, intervenire con un insetticida, facendo attenzione ai tempi di carenza a seconda delle varietà; si può usare Epik, (14 giorni di carenza), oppure Calypso (14 giorni), clorpirifos metile (21 giorni), Trebon (7 giorni); utilizzare un prodotto a base di calcio cloruro per la butteratura

Vite: la situazione fitosanitaria è abbastanza buona, le ultime piogge però hanno determinato un notevole dilavamento, e il meteo caldo umido in qualche caso ha favorito la rottura delle bucce e compromesso la sanità delle femminelle; si consiglia di ripetere eventualmente un trattamento finale a base di rame (ossicloruro, idrossido o solfato); per l'antibotritico, si consiglia un trattamento in questi giorni

sulle uve destinate alla produzione dello sforzato, stando attenti alla carenza ed eventualmente usando Prolectus (14 giorni) o Teldor (7 giorni); sulle uve destinate alla vendemmia tradizionale si può aspettare ancora qualche giorno e usare anche Scala o Switch (21 giorni di carenza) solo in fascia grappolo.