

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di venerdì 12 giugno 2020

Melo: Le infezioni primarie di ticchiolatura possono essere considerate concluse. Il dilavamento nell'ultima settimana però è stato molto consistente e pertanto si rende necessario ripetere gli interventi. In questa fase usare Banjo con 60 giorni di carenza, oppure Nando 63 giorni di carenza, Sercadis, 35 giorni di carenza o Fontelis, 21 giorni di carenza. In caso di sospetta o conclamata presenza di infezioni si può utilizzare dodina, Syllit 544 con 60 giorni di carenza. A breve sarà possibile utilizzare anche captano, con 21 giorni di carenza. Attenzione alla carenza per i trattamenti su Gala.

Per il momento non utilizzare insetticidi, verranno comunicati a breve aggiornamenti per cimice asiatica e carpocapsa. Aggiungere un concime a base di cloruro di calcio per la butteratura amara.

Vite: intervenire per ripetere il trattamento antiperonosporico e antioidico dopo non più di 12-14 giorni da quello precedente e cercare anche di anticiparlo in questa fase, visto l'elevato dilavamento causato dalle piogge degli scorsi giorni. In questo periodo si consiglia per l'ultima volta un prodotto sistemico come Ridomil combi con folpet, Electis trio o Zorvec Zelavin. In alternativa si può iniziare ad utilizzare Mildicut eventualmente con l'aggiunta di 100-150 g/hl di rame, oppure Ampexio o Forum R o analoghi. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire 30-40 g/hl di rame metallo. Contro l'oidio si consiglia un ultimo intervento con Domark o Thiocur in miscela con zolfo bagnabile o liquido a 250- 350 g/hl, oppure iniziare ad usare Kusabi o Vivando o Sercadis sempre in miscela con zolfo bagnabile o liquido. Per lo *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata, nelle zone con due trattamenti obbligatori dalla bassa valle a Sondrio, effettuare il primo intervento tra il 13 e il 23 giugno. Prodotti utilizzabili: Steward oppure Trebon o un prodotto a base di Tau fluvalinate o acrinatrina