

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Servizio Difesa Fitosanitaria

Comunicato di venerdì 26 giugno 2020

Melo: in zona Ponte Valtellina il temporale di ieri ha apportato circa 60 mm di acqua, pertanto i trattamenti effettuati nei giorni precedenti sono stati completamente dilavati. Si consiglia di ripristinare le coperture usando Sercadis, 35 giorni di carenza o Fontelis, 21 giorni di carenza. In caso di sospetta o conclamata presenza di infezioni si può utilizzare dodina, Syllit 544 con 60 giorni di carenza. Si può utilizzare anche captano, con 21 giorni di carenza. Attenzione alla carenza per i trattamenti su Gala.

Cimice asiatica e carpocapsa: da questa settimana ed entro i primi giorni di luglio effettuare un trattamento con Alsystin. Per i biologici si consiglia un trattamento a base di piretro efficace contro le neanidi, e poi eventualmente trattamenti con caolino a 2.5-3 Kg/hl a volume normale

Vite: intervenire per ripetere il trattamento antiperonosporico e antioidico dopo non più di 12-14 giorni da quello precedente e cercare anche di anticiparlo in questa fase, visto l'elevato dilavamento causato dalle piogge degli scorsi giorni.

Attenzione in zona Montagna-Tresivio-Ponte in Valtellina si sono registrati dai 50 ai 60 mm di precipitazioni, per cui i trattamenti coprenti sono stati completamente dilavati.

In questo periodo si consiglia dimetomorf e rame (Forum R, Quasar R, Quantum L con aggiunta di rame ecc.), oppure Mildicut eventualmente con l'aggiunta di 100-150 g/hl di rame, oppure Ampexio, Pergado R ecc. Per i biologici un formulato a base di rame in modo da distribuire 30-40 g/hl di rame metallo. **Attenzione: i biologici in zona Montagna-Tresivio-Ponte in Valtellina hanno la vegetazione completamente scoperta dopo il dilavamento di ieri e devono ripristinare le coperture.** Contro l'oidio si consigliano Kusabi oppure Vivando con aggiunta di 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido. **E' stato segnalato oidio su grappolo in diverse situazioni, eventualmente intervenire con zolfo bagnabile a distanza di 6-7 giorni, oppure Karathane star con poco zolfo bagnabile.** Per lo *Scaphoideus titanus* vettore

della Flavescenza dorata, nelle zone con trattamento unico da Sondrio sx Adda a Tirano il periodo per il trattamento va dal 20 giugno al 5 luglio. Nelle zone con due trattamenti aspettare a effettuare il secondo dal 3 al 20 luglio.