

MIRTILLO: INFORMATIVA SETTIMANALE

comunicato del-21 maggio 2021

Stadio Fenologico (Duke)

Zone precoci: ingrossamento frutti e primissime variazioni di pigmentazione.

Zone tardive: ingrossamento frutti

Come già ricordato nei precedenti comunicati l'andamento meteo di quest'anno rallenta la maturazione della frutta e le raccolte; prevediamo un ritardo di circa una settimana rispetto alla passata stagione, posizionando i primi stacchi di Duke vero la fine della prima decade di giugno.

Poiché la fioritura è terminata da più giorni è ora importantissimo aprire le reti.

Di seguito viene illustrato un semplice metodo, chiamato *augmentorium* per attirare



gli insetti utili (*Trichopria drosophilae*, *Pachycrepoideus vindemiae*, *Leptopilina heterotoma*, *Ganaspis brasiliensis* ecc) e contenere la popolazione di *Drosophila suzukii*.

Brevemente: si prendono frutti danneggiati dal drosofilide e si mettono

in un contenitore come quello della foto; i nemici naturali, più piccoli di *Suzukii*, dovrebbero passare dalla rete, previamente posizionata sopra la scatola; la *Suzuki*, di dimensioni maggiori, non riesce ad uscire. In questo modo creiamo una piccola fabbrica di insetti utili che si nutriranno a spese del drosofilide presente all'interno del mirtilleto.

Alla Fondazione Fojanini siamo a disposizione per dare consigli ed indicazioni per la realizzazione di questo metodo di lotta naturale. Buona norma può essere quella di posizionare 2-3 scatole per circa 1000 metri quadrati di mirtilleto.