

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 25 giugno 2021

Comunicato vite

Ripetere il trattamento antiperonosporico ed antioidico , dopo 12-14 giorni dall'intervento precedente, a seconda dei prodotti utilizzati. In questo periodo si consiglia uno di questi prodotti: Ampexio, Presidum one, Mildicut con aggiunta di rame, Forum R ecc. Aggiungere anche 250-300 g/hl di zolfo bagnabile o liquido e un antioidico come Kusabi o Vivando o Flint. Attenzione alle infezioni di oidio, è importante anche arieggiare la chioma e aggiungere un sistemico. Per i biologici: un trattamento a base di rame in modo da apportare circa 30-40 g/hl di rame metallo, in miscela con uno zolfo bagnabile o liquido (Thiopron, Heliosoufre ecc.), il più possibile a ridosso di precipitazioni in base alle previsioni meteo.

Trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata: per il primo trattamento nelle zone dalla bassa valle a Sondrio con obbligo di due trattamenti: **dal 19 al 27 giugno**

Nelle zone con obbligo di un solo trattamento, da Montagna a Tirano: **dal 24 giugno al 4 luglio**

Prodotti consigliati: Epik o Kestrel, Steward (non ammesso dalla misura 10.1 del PSR), oppure Mavrik o Sivanto.

Comunicato melo

Il contenimento della ticchiolatura appare buono. Si osserva in alcune situazioni una presenza di **oidio**. In questa fase ed entro la prossima settimana si possono usare ancora Sercadis o Fontelis in quanto hanno anche attività antioidica. Dopo l'ultimo Sercadis sarà possibile utilizzare Captano. In caso di presenza consistente di oidio intervenire con zolfo bagnabile o Thiopron. Chi non ha effettuato ancora il trattamento contro **cimice asiatica** deve effettuarlo al più presto con Epik o Kestrel. La prima settimana di luglio ed indicativamente entro il 10 andrà effettuato il trattamento contro **Carpocapsa**. Prodotti

utilizzabili: Prodigy o Intrepid, o in alternativa Coragen o Alsystin. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio per la butteratura.