

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitale 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 4 agosto 2021

Comunicato vite

Le piogge molto intense dell'ultimo periodo (più di 100 mm in una settimana, e circa 200 millimetri da inizio luglio) hanno determinato intensi dilavamenti dei prodotti, per cui anche gli interventi effettuati negli ultimi giorni sono da considerare completamente dilavati.

Le segnalazioni di peronospora sia su foglia che su grappolo sono del tutto sporadiche, ma dopo le piogge, tra una decina di giorni si osserveranno probabilmente macchie su femminelle. Al contempo anche i grappoli sono completamente scoperti e quindi soggetti a infezioni, anche se il rischio di infezione in questo periodo cala sensibilmente.

Per questo motivi si consiglia di intervenire il prima possibile per ristabilire le coperture, utilizzando uno dei seguenti formulati: Forum R3B, Pergado R, Electis R, Quantum L più rame, o anche Zoxium con aggiunta di rame, Mildicut con aggiunta di rame ecc. o in presenza di sintomi su foglia, cimoxanyl+rame. Aggiungere anche 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido e un antioidico come Vivando, Kusabi o Cidely/Rebel top.

Aggiungere eventualmente un concime a base di calcio per favorire l'elasticità della buccia.

Comunicato melo

Ripristinare le coperture in quanto le piogge degli ultimi giorni sono state molto dilavanti. Interventi consigliati in questo periodo: captano (Merpan 80 WDG) a 130 g/hl, con cadenze variabili a seconda della presenza di macchie di ticchiolatura

secondaria. **Attenzione alle Gala: si può utilizzare Bellis o Geoxe** per interventi di chiusura. Prima di effettuare insetticidi per cimice si raccomanda di effettuare controlli, perché l'insetticida sulla cimice non ha effetto preventivo e va usato solo in presenza dell'insetto. Utilizzare **Epik o Kestrel, con 14 giorni di carenza, oppure Trebon up con 7 giorni di carenza**. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio per la butteratura (Butterfill o Alga ca o Caltrac e Actisel