

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitale 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 25 agosto 2021

Comunicato vite

In questa fase vegetativa si consiglia di effettuare interventi a base di **rame ossicloruro, miscele di ossicloruro e idrossido, o solfato** (Coprantol ultra micron, Airone, Poltiglia Disperss ecc.). Sospendere gli interventi a base di zolfo. Il trattamento antimarciume è subordinato alla tenuta della buccia e alla presenza di danni di altro tipo (tignoletta ecc.), oltre che all'andamento meteo, ai cloni, compattezza dei grappoli ecc. E' consigliata l'aggiunta di un concime fogliare a base di calcio (se si usa rame solfato è inutile aggiungerlo perché contiene già calcio). Opzionale l'aggiunta di zeolite che favorisce condizioni di più rapida asciugatura e aiuta a contrastare i marciumi e i danni da moscerini. In questo periodo si raccomanda l'eliminazione delle piante con sintomi conclamati di Flavescenza dorata e d eventualmente di nastrare le piante con sintomi di esca al fine di valutare l'eventuale estirpo o la potatura a parte rispetto alle altre piante.

Comunicato melo

Interventi per ticchiolatura e marciumi consigliati in questo periodo su varietà Golden, Stark e Rockit: captano (Merpan 80 WDG), entro venerdì 27 nelle zone precoci da Ponte a Villa di Tirano, indicativamente entro il 1° settembre in quelle tardive. Ricordare il limite di 16 interventi max tra dithianon e captano. **ATTENZIONE ALLA DERIVA SULLE GALA.**

Prima di effettuare insetticidi contro la cimice asiatica si raccomanda di effettuare controlli alla mattina presto, in particolare sulle file di bordo, e nei frutteti confinanti a nocioleti o altre colture attrattive. L'insetticida sulla cimice non ha effetto preventivo e va usato solo in presenza dell'insetto. Acetamiprid (Epik, Kestrel) ha 14 giorni di carenza, etofenprox (Trebon up) ha 7 giorni di carenza. Avvisare comunque i servizi tecnici prima di decidere di effettuare il trattamento. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio per la butteratura.