

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 9 maggio 2022

Melo

Nei giorni scorsi si sono verificate piogge sporadiche che non hanno determinato forte dilavamento ma soprattutto bagnature prolungate con innesco di infezione di ticchiolatura; chi ha trattato **prima di giovedì scorso** è opportuno che rifaccia il trattamento entro domani sera con coprente più sistemico. Prodotti consigliati Delan e Score. In postfioritura si può effettuare un trattamento aficida con Epik oppure Sivanto o Closer. Per le zone tardive, tassativamente vietato trattare con insetticidi i frutteti ancora in fioritura. Prima di trattare con insetticidi effettuare il taglio dell'erba. In alcuni frutteti si osservano danni da ricamatori, in questo caso intervenire con Prodigy o Intrepid.

Vite

Le piogge dei giorni scorsi sono state molto sporadiche e hanno causato più che altro bagnature ma non apporto effettivo di acqua. Le condizioni per l'infezione primaria di peronospora in teoria non sono ancora soddisfatte, ma c'è comunque rischio di infezioni di oidio. A livello cautelativo si consiglia un primo intervento **entro giovedì 12 maggio nelle zone più precoci**, mentre nelle zone tardive si può aspettare tranquillamente fino alla fine della settimana, inizio della prossima, più che altro sempre per il rischio di oidio. Prodotti consigliati: Forum R o Pergado R,

oppure Prevint top o Enervin top, aggiungendo zolfo bagnabile o liquido per l'oidio. Aggiungere un sistemico antioidico come Domark solo se le temperature aumentano e si intende tenere intervalli tra i trattamenti di 12-14 giorni.