

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 7 giugno 2022

Melo

Ticchiolatura: per chi avesse trattato da più di 7-8 giorni rinnovare le coperture. Effettuare controlli per verificare di non avere infezioni; in caso di assenza di infezioni usare Sercadis o Fontelis; in caso di presenza di infezioni su foglie o frutti usare dodina; per i **biologici** a fine infezioni primarie, usare rame a dosi basse per assicurare le coperture, in caso di presenza di infezioni intervenire con polisolfuri; sulla fine delle infezioni primarie se si è puliti è possibile usare anche bicarbonato di potassio (es. Vitikappa) in miscela con zolfi.

Cimice asiatica: è stata segnalata presenza di cimice soprattutto su ciliegio, nocciolo e altre colture. Nelle zone precoci si consiglia di intervenire questa settimana con un prodotto insetticida; consigliati Epik SL o Kestrel a base di acetamiprid (max due trattamenti/stagione).

Vite

In questa fase molto perturbata si consiglia di rinnovare gli **interventi antiperonosporici** a non più di 12-14 giorni dal trattamento precedente, se si sono usati sistemici. Utilizzare ancora Electis trio, oppure Folpan Gold o prodotto analogo,

o Ridomil R. In alternativa si possono usare Zorvec Vinabel o Zorvec Vinabria. Per i **biologici**, attenzione ai dilavamenti e rinnovare le coperture dopo 25-30 mm di acqua. Per l'**oidio** aggiungere 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, e un sistemico come Domark o Thiocur 20 EW. Segnalateci eventuali presenze importanti di Black rot. Sono state pubblicate le date per i trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata: nelle zone con obbligo dei **due interventi** si consiglia di procedere **con il primo dal 11 al 20 giugno** e **con il secondo dal 25 giugno al 4 luglio**, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 giorni. Nelle zone con obbligo di un solo intervento il periodo consigliato è **dal 17 al 28 giugno**.