

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954  
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3  
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di mercoledì 22 giugno 2022

### Melo

**Ticchiolatura:** per chi avesse trattato da più di 10-14 giorni rinnovare le coperture. Effettuare controlli per verificare di non avere infezioni; in questa fase si consiglia captano (Merpan 80 WDG); in caso di presenza di infezioni su foglie o frutti usare dodina, ma attenzione alla carenza in caso di trattamenti su Gala; per i **biologici** a fine infezioni primarie, usare rame a dosi basse per assicurare le coperture; se si è puliti è possibile usare anche bicarbonato di potassio (es. Vitikappa) in miscela con zolfi.

**Carpocapsa:** a chi tratta in questi giorni, nelle zone precoci si consiglia di aggiungere un prodotto per la carpocapsa; possono andare bene metossifenozone (Prodigy, Intrepid) oppure clorantraniliprole (Coragen, Voliam, Vesticor). Nelle zone tardive attendere i primi di luglio.

## Vite

Nelle ultime due settimane il rischio di **infezioni peronosporiche** è stato molto contenuto; si consiglia di rinnovare gli **interventi** dopo 12-14 giorni dal trattamento precedente, a seconda della tenuta dei formulati, senza anticiparli. In questa fase si consigliano Forum R 3B, Quantum L con aggiunta di rame, Pergado SC con aggiunta di rame. Per l'**oidio** aggiungere 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, sospendere i sistemici e passare a prodotti come Vivando o Nabucco, Flint (specialmente in presenza di Black rot), o Kusabi.

Segnalateci eventuali presenze importanti di Black rot.

Per i **biologici**, attenzione ai dilavamenti e rinnovare le coperture con rame e zolfo dopo 25-30 mm di acqua.

Contro *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata: nelle zone con obbligo dei **due interventi** si consiglia di procedere **con il secondo intervento dal 25 giugno al 4 luglio**, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 giorni. Nelle zone con obbligo di un solo intervento il periodo consigliato è **dal 17 al 28 giugno**. **Prodotti consigliati: Epik oppure Sivanto o un piretroide come Mavrik. Non effettuare due trattamenti con piretroidi perché favoriscono gli attacchi di ragno rosso. E' stato inserito nei disciplinari anche l'insetticida Closer. Si raccomanda la massima attenzione alla comparsa di sintomi di flavescenza dorata in vigneto, le piante vanno estirpate tempestivamente o in caso di dubbi segnalate al Servizio fitosanitario regionale o alla Fondazione Fojanini.**