

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954  
- in orario ufficio: alla risposta digitare 3  
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

**Comunicato di lunedì 8 agosto 2022**

**Melo**

**Ticchiolatura:** in considerazione dei dilavamenti causati dalle ultime precipitazioni, si consiglia, dove si sia trattato da più di 15 giorni, di intervenire con captano (Merpan 80 WDG, 21 giorni di carenza); **ATTENZIONE A NON FARE DERIVA SULLE GALA CHE SONO PROSSIME ALLA RACCOLTA.** Su Gala in zone tardive, all'aoccorrenza si possono usare Bellis con 7 giorni di carenza o Geoxe con 3 giorni di carenza. Per i **biologici** a fine infezioni primarie, usare rame a dosi basse per assicurare le coperture; se si è puliti è possibile usare anche bicarbonato di potassio (es. Vitikappa) in miscela con zolfi.

EFFETTUARE CONTROLLI SULLA PRESENZA DI CIMICE ASIATICA O DANNI DA CIMICE, ANCHE IN BASE AL RISCONTRO SUL RACCOLTO DELLE GALA, E SEGNALARE LA SITUAZIONE AI SERVIZI TECNICI. **NON EFFETTUARE INSETTICIDI IN QUESTO MOMENTO!**

## Vite

Nelle ultime settimane il rischio di **infezioni peronosporiche** è stato molto contenuto complice l'andamento meteo; in queste condizioni si possono allungare i turni anche a 18-20 giorni, compatibilmente col rischio di oidio (che può essere in aumento visto l'elevato tasso di umidità). In questa fase si consigliano Forum R 3B, Quantum L con aggiunta di rame, Pergado SC con aggiunta di rame, zoxamide + rame (Electis R), Ampexio o Mildicut o Daramun + rame. In presenza di macchie di peronospora su foglia o peronospora larvata (molto rara) utilizzare cimoxanil e rame. Per l'**oidio** aggiungere 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, ed eventualmente un prodotto come Vivando, Kusabi, oppure anche solo zolfo.

Segnalateci eventuali presenze importanti di Black rot.

Per i **biologici**, in previsione di eventuali, piogge rinnovare le coperture con rame e zolfo dopo 25-30 mm di acqua.

Le tempistiche per i trattamenti obbligatori previsti dalla normativa contro *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata, sono ormai concluse. Se non fosse stato eseguito tuttavia si raccomanda di effettuarlo il prima possibile. In alcune zone in modo localizzato si riscontrano catture elevate.

**Si raccomanda soprattutto la massima attenzione alla comparsa di sintomi di Flavescenza dorata in vigneto; le piante vanno estirpate tempestivamente o in caso di dubbi segnalate al Servizio fitosanitario regionale o alla Fondazione Fojanini.**