

MIRTILLO: INFORMATIVA SETTIMANALE

comunicato dell'11 marzo 2023

Stadio Fenologico (Duke):

Zone precoci: gemma aperta

Zone tardive: gemma gonfia

Operazioni Colturali:

Per favorire la cicatrizzazione e la sanificazione dei tagli di potatura è consigliabile eseguire un intervento con agrofarmaci a base di rame metallo, preferendo i formulati registrati su mirtillo e seguendo le dosi in etichetta; la temperatura consigliata è di 10-12°C.

Dai rilievi fatti l'utilizzo di olio minerale è ancora consigliabile solo dove la fase fenologica è a gemma gonfia mentre se le piante si trovano già nella fase di gemma aperta si rischiano problemi di fitotossicità.

Consigli :

A causa dell'andamento meteo di questo periodo, molto critico dal punto di vista delle precipitazioni, è necessario valutare la possibilità di impiegare l'irrigazione allo scopo di aumentare l'umidità nel terreno e ridurre i possibili danni causati dalla disidratazione (frutteti con piante piccole, giovani, molto esposti al sole e al vento, con varietà precoci dove la fase fenologica è già avanzata o piante in vaso).

Questo consiglio vale anche per i nuovi impianti che verranno realizzati nelle prossime settimane; si consiglia quindi la messa a dimora delle nuove piante solo se si ha la possibilità di utilizzare l'impianto irriguo.



**Per ulteriori consigli potete contattare il tecnico di riferimento presso la
Fondazione Fojanini al seguente numero di cell. 347-3768354**