

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 22 maggio 2023

Vite: questi giorni sono caratterizzati ancora da instabilità meteo. Al momento non sono state segnalate macchie di infezioni primaria di peronospora, e le temperature basse dei giorni scorsi determinano allungamenti dei tempi di incubazione. Attenersi comunque agli intervalli tra i trattamenti consigliati con i diversi formulati. In questa fase si possono utilizzare prodotti sistemici come Ridomil R o prodotti analoghi contenenti metalaxyl e rame, oppure Zorvec Vinabel, Orondis forte, oppure Folpan gold, Actlet F ecc. Per l'oidio usare zolfo bagnabile con aggiunta di Spirox o Prosper, oppure Domark 125, Revysion o prodotti analoghi.

Melo: per la ticchiolatura, chi ha trattato prima di venerdì 19 deve intervenire possibilmente entro mercoledì 24 con curativo (Score, Revysion), in miscela con un coprente. Chi ha trattato nei giorni successivi per ora ha la vegetazione coperta; verranno forniti aggiornamenti a seconda dell'andamento meteo. Sono iniziati i voli della Carpocapsa. Nelle zone precoci si consiglia di intervenire indicativamente entro metà settimana. In quelle più tardive si può aspettare ed arrivare anche verso fine settimana-inizio della prossima. Utilizzare Coragen oppure Vesticor. Per i biologici, si consiglia il primo trattamento con virus della granulosa (Madex) e nelle zone problematiche, procedere successivamente all'applicazione dei diffusori Ecodian del disorientamento. Con Madex, occorre intervenire 3-4 volte su ogni generazione con trattamenti distanziati di circa 8 giorni.

Effettuare l'insetticida possibilmente con tempo stabile e tagliare l'erba prima di fare il trattamento. In questo periodo si consiglia di trattare con magnesio specialmente nei frutteti soggetti a filloptosi, visto l'andamento meteo piovoso, e successivamente con concimi a base di calcio per la butteratura.