

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di venerdì 16 giugno 2023

**Vite:** Sono segnalate con una certa frequenza infezioni di peronospora, in qualche caso anche su grappolo. In questo periodo il rischio di infezione è ancora elevato, considerando la fase fenologica e la frequenza dei temporali che causano dilavamenti. Rispettare scrupolosamente i turni tra i trattamenti indicati in etichetta, e nel dubbio anticipare l'intervento. Si possono utilizzare prodotti contenenti dimetomorf e rame, come Quasar R, Quantum R, oppure cimoxanyl e rame (es. Cymbal + Airone, Cuproxat o altri). Per l'oidio usare zolfo bagnabile con aggiunta di Kusabi, Flint o Vivando, avendo l'accortezza di accorciare le tempistiche di intervento a 8-10 giorni. È stato pubblicato il comunicato regionale per la difesa dallo *Scaphoideus titanus* vettore della Flavescenza dorata; in tutta la provincia di Sondrio vanno effettuati due interventi insetticidi. Il primo trattamento va effettuato dal 17 al 28 giugno. Prodotti consigliati: Epik o Kestrel, Mavrik oppure Trebon up e piretro per i biologici.

**Melo:** per la ticchiolatura, in considerazione dei dilavamenti e dell'instabilità meteorologica prevista ancora per i prossimi giorni, si consiglia di ripetere le coperture dopo dilavamenti consistenti, di 40 -50 mm. Si possono usare Fontelis o Sercadis, ma si può iniziare ad utilizzare anche Dodina o Captano. **Cimice asiatica:** sinora sono presenti ancora prevalentemente gli adulti; sono state però osservati i primi stadi giovanili dalle ovature appena schiuse. Nei prossimi giorni ci sarà uno

sviluppo con stadi successivi, che saranno in grado di muoversi attivamente. È pertanto consigliabile nei prossimi giorni effettuare un trattamento insetticida, a base di acetamiprid, con Epik oppure Kestrel.

Si consiglia di trattare con magnesio specialmente nei frutteti soggetti a filloptosi, visto l'andamento meteo predisponente, e successivamente con concimi a base di calcio per la butteratura. Non miscelare i due concimi fogliari.