## Notiziario Tecnico

## SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di venerdì 14 luglio 2023

Vite: in questo periodo si consiglia di intervenire con prodotti ramati, eventualmente anticipando il trattamento anche in considerazioni dei forti dilavamenti causati dalle piogge molto intense, e anche considerando i danni da grandine in diverse zone. Si possono ancora utilizzare dimetomorf e rame, come Quasar R, Quantum R, specialmente in presenza di peronospora. In alternativa si consigliano cimoxanyl e rame (es. Cymbal + Airone, Cuproxat o altri). In assenza di malattia vanno bene anche Pergado SC con aggiunta di rame o Electis R. Per l'oidio usare zolfo bagnabile con aggiunta di Kusabi, Flint o Quadris o Vivando. Preferire Flint e Quadris in caso di presenza di Black rot.

Se non è ancora stato effettuato, fare il secondo dei due trattamenti previsti obbligatori per legge contro lo Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata, che in teoria andava eseguito dal 30 giugno al 12 luglio, con un intervallo tra il primo e il secondo trattamento, di circa 14 giorni. Per i biologici sono previsti 3 trattamenti.

- per il secondo trattamento è opportuno impiegare una sostanza attiva efficace anche sugli adulti come flupyradifurone (Sivanto prime) o acetamiprid (Epik SL, Kestrel);
- per i biologici usare preferibilmente piretro, oppure sali potassici di acidi grassi, olio di arancio dolce o Naturalis;
- Per ulteriori informazioni vedere il Notiziario.

**Melo**: in ragione degli intensi dilavamenti, ripetere le coperture contro la ticchiolatura. In questo periodo si consiglia Captano. Aggiungere un prodotto a base di sali calcio per la butteratura. Segnalare al servizio tecnico di Melavì o alla Fojanini eventuali particolari presenze di cimice asiatica, prestando attenzione anche agli stadi giovanili, e di eventuali danni.