

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 23 agosto 2023

Vite: in questo periodo si consiglia di intervenire con prodotti ramati. Ormai l'invaiaatura è quasi ovunque in stadio molto avanzato, quindi si consigliano prodotti contenenti solo rame come Coprantol, Cuproxat, Poltiglia disperss ecc. Inutile e impossibile pretendere di avere le femminelle perfette con l'andamento di quest'anno, puntare a preservare la sanità del grappolo. Per l'oidio utilizzare zolfo bagnabile a 200-250 g/hl oppure Vivando, Kusabi o Flint. Ad invaiatura completa sospendere con gli zolfi. Per ora non si rendono necessari antibiotritici.

Melo: effettuare un trattamento di chiusura al più presto con Captano, possibilmente entro domani, vista la carenza (21 giorni) su Golden e Stark che potrebbero avere un inizio raccolta intorno al 13 settembre. Attenzione alla deriva sulle Gala. Su impianti giovani o scarichi non effettuare trattamenti o usare Flint (14 giorni di carenza). Chi non conferisce a Melavì o non deve rispettare disciplinari particolari con limitazioni dei residui, ha a disposizione anche Bellis (7 giorni di carenza) o Geoxe (3 giorni). Da qualche giorno si osserva presenza di ovature e stadi giovanili di cimice asiatica (soprattutto secondo stadio, che è il primo a muoversi, ma anche successivi). Visto il rischio di incremento della popolazione, e il fatto che gli stadi giovanili sono quelli su cui funzionano maggiormente gli insetticidi, onde evitare presenza di danni al raccolto si consiglia, almeno nelle zone fortemente colpite lo scorso anno, o dove in questi giorni si sia vista particolare presenza, in particolare a fianco di boschi o incolti, di trattare con Epik o Kestrel, che hanno 14 giorni di carenza.