

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 31 agosto 2023

Vite: in questo periodo si consiglia di intervenire con prodotti ramati. Ormai l'invasione è ovunque in stadio molto avanzato, quindi si consigliano prodotti contenenti solo rame come Coprantol, Cuproxat, Poltiglia dispersa ecc. Inutile e impossibile pretendere di avere le femminelle perfette con l'andamento meteo e la presenza di malattia di quest'anno, puntare a preservare la sanità del grappolo ed eventualmente spuntare le femminelle. Per l'oidio solo nelle zone più tardive utilizzare zolfo bagnabile a 200-250 g/hl oppure Vivando, Kusabi o Flint, altrove si possono sospendere gli antioidici. Nelle zone più precoci, in particolare dove è prevista la raccolta di uve per gli sforzati, in base alle date che verranno indicate e alle singole esigenze si consiglia prossimamente l'aggiunta di un prodotto antibotritico, considerando che Switch, Kenja, Geoxe e Banjo hanno 21 giorni di carenza, Nando 28 giorni, Prolectus 14 giorni, Teldor 7 giorni. Si consiglia di utilizzare pyrimethanil (Scala, Brezza ecc.) solo su uve destinate alla vinificazione per autoconsumo, per problemi degli elevati residui che lascia sulle uve.

Melo: per ticchiolatura, se si intende rifare il trattamento dilavato dalle forti piogge del fine settimana, ormai è possibile usare solo Flint (14 giorni di carenza) prestando attenzione alle possibili date previste per la raccolta di Golden e Stark, e quindi praticamente solo per le zone tardive, oppure Bellis (7 giorni di carenza) o Geoxe (3 giorni). Da ormai due settimane si osservano presenze di ovature e soprattutto stadi giovanili di cimice asiatica. Visto il rischio di incremento della popolazione, e il fatto che gli stadi giovanili sono quelli su cui funzionano maggiormente gli

insetticidi, onde evitare presenza di danni al raccolto, se non è ancora stato fatto si consiglia di effettuare nel brevissimo periodo, almeno nelle zone fortemente colpite lo scorso anno, o dove in questi giorni si sia vista particolare presenza, di trattare con Epik o Kestrel, che hanno 14 giorni di carenza e quindi al più presto tenendo conto delle tempistiche ormai ristrette e stando attenti alla deriva sulle Gala dove sono ancora in fase di raccolta.