

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 10 aprile 2024

Melo

La pioggia iniziata ieri sera ha determinato le condizioni per un'infezione di ticchiolatura. Chi ha trattato lunedì o ieri mattina ha la vegetazione coperta e per ora non deve effettuare interventi.

Chi ha trattato la scorsa settimana, tra accrescimento vegetativo e dilavamento (circa 30 mm di precipitazioni finora), deve effettuare un intervento curativo, intervenendo indicativamente entro venerdì sera con Chorus o Pyrus più coprente, oppure entro sabato sera con Score o Revysion più coprente. Si consiglia comunque di intervenire non appena torna il bel tempo perché gli interventi eseguiti nella prima parte della finestra di infezione sono più efficaci.

In questo periodo come antioidico può andare bene Cidely oppure zolfo, ma revysion è efficace anche su oidio.

In fioritura sono tassativamente vietati i trattamenti insetticidi.

Vite

Lo sviluppo vegetativo è molto disforme, con viti che si trovano in uno stadio compreso tra inizio ripresa vegetativa nelle zone tardive, fino a germogli di 10-15 cm ed oltre nelle zone precoci, come in bassa valle. Sono stati segnalati danni da nottue e soprattutto geometridi (cumpas), ma molto sporadici, nelle scorse settimane, soprattutto nelle zone tardive. Al momento dovremmo essere fuori dalla fase di rischio anche nelle zone tardive. Si raccomanda di posizionare per tempo i diffusori della confusione della tignoletta, perché

con l'aumento delle temperature, se si arriva in ritardo possono iniziare i voli della prima generazione. Indicativamente si consiglia di applicarli entro il 15-20 aprile. Nei prossimi giorni, in particolare dove ci sono stati problemi di oidio lo scorso anno, si consiglia di effettuare un trattamento con zolfo in polvere sui germogli.