

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 14 maggio 2024

Vite

Si iniziano a segnalare in diversi vigneti **macchie diffuse di infezione primaria di peronospora**, per ora prevalentemente tra Castione e Berbenno. Le piogge infettanti sono probabilmente quelle dei primi di maggio, ma con queste umidità potrebbe essere anche un'infezione di settimana scorsa, favorita da temperature massime elevate nei giorni scorsi. In alcuni casi le macchie sono già sporulate.

In caso di presenza significativa, si rende assolutamente necessario intervenire il prima possibile, possibilmente giovedì, e comunque entro sabato, con dimetomorf (per chi può usarlo), o cimoxanyl. Anche in caso di utilizzo di metalaxyl, meglio aggiungere del cimoxanyl. Meglio sarebbe abbinare folpet + cimoxanyl o folpet + dimetomorf. Per i biologici: intervenire al più presto ripristinando le coperture, e non risparmiando troppo in questo momento sui dosaggi di rame. Aggiungere se possibile un bagnante.

Oidio: trattare con zolfi liquidi o bagnabili, con aggiunta di Scudex o Topas (solo per chi non conferisce alle cantine), o Domark o sistemico analogo.

Melo

La pioggia di ieri con conseguente bagnatura fogliare ha determinato una nuova infezione primaria di ticchiolatura. I dilavamenti non sono stati importanti, per cui si consiglia: nei frutteti trattati prima di sabato 11, intervenire appena possibile con sistemico + coprente; nei frutteti trattati sabato 11, intervenire appena possibile con solo coprente; nei frutteti trattati domenica 12, questi sono da considerare coperti, ma occorre rifare eventualmente una copertura giovedì, e valutare se le piogge di domani saranno ulteriormente dilavanti.

Prodotti utilizzabili: Sercadis, Luna experience, Delan, Nando maxi. Aggiungere un antioidico. Sercadis e Luna hanno anche azione antioidica.

Sono iniziati i voli della Carpocapsa; verso fine settimana-inizio della prossima, con tempo stabile si può iniziare nelle zone più precoci ad effettuare il trattamento, con Coragen o altro prodotto contenente clorantraniliprole.