

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 16 maggio 2024

Vite

Si iniziano a segnalare in diversi vigneti **macchie diffuse di infezione primaria di peronospora**, in diverse zone ma prevalentemente tra Castione e Buglio in Monte. Le piogge infettanti sono probabilmente quelle dei primi di maggio, ma con queste umidità potrebbe essere anche un'infezione di settimana scorsa, favorita da temperature massime elevate nei giorni scorsi. In alcuni casi le macchie sono già sporulate.

In caso di presenza significativa, si rende assolutamente necessario intervenire il prima possibile, possibilmente entro sabato, con dimetomorf (per chi può usarlo), o cimoxanyl. Anche in caso di utilizzo di metalaxyl, meglio aggiungere del cimoxanyl. Meglio sarebbe abbinare folpet + cimoxanyl o folpet + dimetomorf. In assenza di macchie, ripetere gli interventi senza aspettare troppo, anzi cercare di anticipare.

Per i biologici: intervenire al più presto ripristinando le coperture, e non risparmiando troppo in questo momento sui dosaggi di rame, e controllare le piogge. La vegetazione non va lasciata scoperta! Aggiungere se possibile un bagnante.

Oidio: trattare con zolfi liquidi o bagnabili a 250-300 g/hl, con aggiunta di Scudex o Topas (solo per chi non conferisce alle cantine), o Domark o sistemico analogo.

Melo

La pioggia di ieri ha determinato una bagnatura lunghissima, che ha causato ancora un'infezione di ticchiolatura, segnalata anche dai modelli previsionali. In questo periodo di elevata umidità e piogge continue occorre mantenere ancora elevata l'allerta nei confronti

delle infezioni primarie, per cui si consiglia di intervenire appena possibile, se si è trattato da più di 3 giorni (in teoria anche per chi ha trattato domenica), possibilmente entro sabato sfruttando la finestra di bel tempo, con un sistemico in miscela con coprente. Chi è riuscito a intervenire martedì ha la vegetazione per ora coperta, ma deve intervenire tra sabato e domenica ancora almeno con un coprente perché sono ancora previste precipitazioni per settimana prossima. Come coprenti sono consigliati Delan, Ohayo, oppure anche Luna che contiene sia coprente che sistemico. In caso di utilizzo di Sercadis meglio aggiungere un po' di coprente. Come sistemici, quelli più efficaci sono Score e Revysion. Attenzione, con Revysion non andare troppo in là con gli interventi perché tende a residuare. Tra due interventi con Revysion deve essere rispettato un intervallo minimo di 7 giorni. Per i biologici: intervenire durante le precipitazioni con polisolfuro di calcio, o in previsione di piogge leggere, Thiopron e poi valutare se rifare un polisolfuro in caso di dilavamento.

Sono iniziati i voli della Carpocapsa; con la prima finestra di bel tempo, con tempo stabile si può iniziare nelle zone più precoci ad effettuare il trattamento, con Coragen o Voliam. In caso di condizioni meteo instabili però piuttosto si consiglia di rimandare alla settimana prossima. Per i biologici, iniziare a usare Madex (virus granulosi) perché il prodotto deve essere già sulla foglia prima che escano le larve.