

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 21 maggio 2024

Vite

Attenzione: allerta massima! Si iniziano a segnalare in diversi vigneti **macchie diffuse di infezione primaria di peronospora**, in parte già sporulate. Ogni evento piovoso da qui in avanti determina nuovi rischi di infezione, con partenza di infezioni secondarie.

Se sono presenti macchie, intervenire assolutamente il prima possibile, anche se non sono trascorsi i giorni da etichetta, con dimetomorf (per chi può usarlo), o cimoxanyl, con folpet ed eventualmente aggiungendo del rame o in alternativa prodotti contenenti fosfito di potassio o fosfonato.

In assenza di macchie, ripetere comunque gli interventi senza aspettare troppo, anzi cercare di anticipare. Prodotti consigliati: quelli a base di folpet e metalaxyl (Sesto gold, Folpan gold ecc.) o Electis trio oppure Orondis forte o Zorvec vinabel o Vinabria, eventualmente in miscela con cimoxanyl per maggior sicurezza.

Black rot: sono stati segnalati sintomi in alcuni vigneti, con necrosi anche su tralcio. In caso di presenza di sintomi intervenire con Score, oppure Flint o Quadris, o usando Metiram come coprente.

Per i biologici: intervenire al più presto ripristinando le coperture, e non risparmiando troppo in questo momento sui dosaggi di rame, e controllare le piogge. La vegetazione non va lasciata scoperta! Aggiungere se possibile un bagnante.

Oidio: trattare con zolfi liquidi o bagnabili a 250-300 g/hl, con aggiunta di Scudex o Topas (solo per chi non conferisce alle cantine), o Domark o sistemico analogo.

Melo

Attenzione: vanno considerate ancora primarie le infezioni di ticchiolatura di questo periodo, sono state segnalate anche macchie in alcune situazioni.

In questo periodo di elevata umidità e piogge continue occorre mantenere pertanto elevata l'attenzione. Si consiglia, vista l'elevata instabilità, di ripetere un coprente domani, e se si è trattato da più di 3 giorni aggiungere un sistemico.

Come coprenti sono consigliati Delan, Ohayo, oppure anche Luna che contiene sia coprente che sistemico. In caso di utilizzo di Sercadis meglio aggiungere un po' di coprente. Come sistemici, quelli più efficaci sono Score e Revysion. Tra due interventi con Revysion deve essere rispettato un intervallo minimo di 7 giorni. Per i biologici: intervenire ancora durante le precipitazioni con polisolfuro di calcio, o in previsione di piogge leggere, Thiopron e poi valutare se rifare un polisolfuro in caso di dilavamento.

Carpocapsa: se non è ancora stato fatto, trattare con Coragen o Voliam. In caso di condizioni meteo instabili però piuttosto si consiglia di rimandare il trattamento. Per i biologici, iniziare a usare Madex (virus granulosi) perché il prodotto deve essere già sulla foglia prima che escano le larve.