

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 28 maggio 2024

Vite

Attenzione: Si segnalano in diversi vigneti macchie diffuse di infezione primaria di peronospora, in parte già sporulate. Ogni evento piovoso determina nuovi rischi di infezione, con partenza di infezioni secondarie. Il rischio è pertanto molto elevato anche perché siamo in fioritura.

In presenza di infezioni limitate, si consiglia esclusivamente di ripetere il trattamento non aspettando oltre 10-12 giorni da quello precedente, approfittando delle finestre di bel tempo, e usando formulati sistemici come Sesto Gold, Folpan Gold, Zorvec Vinabel o Vinabria ecc. Con presenza di infezioni più importanti usare folpet con metalaxyl (Sesto gold, Folpan gold ecc.) ma aggiungendo anche cimoxanyl o dimetomorf. Le infezioni sono ferme se compaiono necrosi sulle macchie d'olio.

Per i biologici: intervenire ripristinando le coperture, e non risparmiando troppo in questo momento sui dosaggi di rame, e controllare le piogge. La vegetazione non va lasciata scoperta! Aggiungere se possibile un bagnante.

Oidio: trattare con zolfi liquidi o bagnabili a 250-300 g/hl, con aggiunta di Scudex o Topas (solo per chi non conferisce alle cantine), o Domark o sistemico analogo.

Melo

In considerazione delle continue bagnature fogliari, nei frutteti trattati da più di 6 giorni si consiglia di rinnovare le coperture. Come coprenti sono consigliati Delan, Ohayo, oppure anche un ultimo Luna che contiene sia coprente che sistemico. In caso di utilizzo di Sercadis

meglio aggiungere un po' di coprente. In caso di utilizzo di sistemici, quelli più efficaci sono Score e Revysion. Tra due interventi con Revysion deve essere rispettato un intervallo minimo di 7 giorni. Per i biologici: intervenire ancora durante le precipitazioni con polisolfuro di calcio, o in previsione di piogge leggere, Thiopron e poi valutare se rifare un polisolfuro in caso di dilavamento.

Carpocapsa: se non è ancora stato fatto, trattare il prima possibile con Coragen o Voliam. In caso di condizioni meteo instabili però piuttosto si consiglia di rimandare il trattamento. Per i biologici usare Madex (virus granulosi) perché il prodotto deve essere già sulla foglia prima che escano le larve.