

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

**Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria**

**Comunicato di mercoledì 5 giugno 2024**

## **Vite**

Attenzione: Si segnalano in diversi vigneti infezioni diffuse di peronospora, in parte sporulate, anche sui grappoli. Il rischio di nuove infezioni e peggioramento della situazione è molto elevato vista anche la fase fenologica compresa tra fioritura e allegagione.

In presenza di infezioni limitate, si consiglia esclusivamente di ripetere il trattamento non aspettando oltre 10-12 giorni da quello precedente, approfittando delle finestre di bel tempo, e usando formulati sistemici come Sesto Gold, Folpan Gold, Zorvec Vinabel o Vinabria ecc. Con presenza di infezioni importanti si consiglia di intervenire con folpet e metalaxyl (Sesto gold, Folpan gold ecc.) ma aggiungendo anche cimoxanil o dimetomorf. Le infezioni sono ferme se compaiono necrosi sulle macchie d'olio. Si possono fare fino a 3 interventi con metalaxyl+folpet, anche per chi è in misura 10.1 del PSR. In questa fase di fine fioritura sono molto indicati Zorvec e Orondis. Evitare di usare prodotti a base di fosetyl-al in presenza di infezioni importanti, e soprattutto se non si è fatta una strategia di fosetyl-al da inizio stagione. Da inizio allegagione, passare a dimetomorf e rame (Forum R o analoghi).

Per i biologici: intervenire ripristinando le coperture, e non risparmiando troppo in questo momento sui dosaggi di rame, e controllare le piogge. La vegetazione non va lasciata scoperta! Aggiungere se possibile un bagnante.

**Oidio:** trattare con zolfi liquidi o bagnabili a 250-350 g/hl, con aggiunta di Scudex o Topas (solo per chi non conferisce alle cantine), o Domark o sistemico analogo. Da allegagione in poi si possono sospendere i sistemici e passare a Kusabi, Quadris ecc.

Attenzione alle infezioni di **black rot**, che ha incubazioni molto lunghe, in caso di bisogno usare Quadris o Flint.

**Il primo trattamento insetticida per lo Scaphoideus titanus della Flavescenza dorata va effettuato dal 14 al 25 giugno, quindi per ora non effettuare insetticidi.**

## **Melo**

In considerazione delle frequenti precipitazioni, nei frutteti trattati da più di 7-10 giorni si consiglia di rinnovare le coperture per la **ticchiolatura**. Come coprenti sono consigliati Delan o Nando maxi. In caso di presenza di infezioni usare un ultimo curativo sistemico tra Revysion e Score, oppure dodina. Contro **alternaria**, possibile in questa annata piovosa, si possono usare dodina, fluazinam o captano. Per i biologici: intervenire con formulati a base di rame a basso dosaggio, oppure bicarbonato di potassio (Karma, Armicarb ecc.), formulati a base di zolfo e olio essenziale di arancio dolce (Prev-am ecc.).

Si osserva in diverse situazioni una presenza di afide grigio e di afide lanigero, in questa fase si può usare Pirimor o Aphox, mentre per il lanigero è più indicato il Movento, possibilmente da solo o in miscela con pochi principi attivi.