

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 26 luglio 2024

Vite

Contrariamente a quanto osservato nelle precedenti annate, si stanno osservando anche in quest'ultimo periodo nuovi sintomi di peronospora larvata in concomitanza con elevata presenza di macchie su foglia. **Si consiglia pertanto di non attendere oltre le due settimane a ripetere gli interventi.** In questa fase ormai i citotropici e curativi danno scarsi risultati, si consiglia pertanto di usare **Pergado SC con aggiunta di rame oppure Mildicut/Daramun/Manamid/Back sempre con aggiunta di rame, o Electis R o zoxamide pura con aggiunta di rame.** L'aggiunta di cimoxanil ormai può aiutare poco, ma se si vuole aggiungere non ci sono particolari controindicazioni. **È in forte aumento invece il rischio di oidio,** usare pertanto zolfi liquidi o bagnabili a dose medio alta, specie dove si sono già osservati grappoli colpiti, con aggiunta di Cidely o Rebel top se sono presenti infezioni, o in alternativa Karathane star con una dose minima di zolfo. In assenza di infezioni usare Vivando o prodotti analoghi a base di metrafenone, oppure Kusabi. Aggiungere eventualmente un concime fogliare a base calcio.

Melo

In questa fase si consiglia di ripristinare le coperture con captano a distanza di 15-18 giorni. Attenzione all'oidio, usare zolfi bagnabili o liquidi. Se si è effettuato un trattamento con Epik

o Kestrel nelle ultime due settimane non si consigliano al momento altri interventi contro la cimice asiatica. Analogamente non si rendono necessari al momento altri trattamenti per carpocapsa.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura amara.