

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 9 agosto 2024

Vite

Nelle ultime due settimane si è osservato un netto calo del rischio delle infezioni di peronospora, sia per le scarse precipitazioni, sia perché la fase fenologica è meno sensibile. Il rischio di oidio è medio alto a seconda delle zone e della precocità, ma attualmente in calo. In queste condizioni si possono allungare gli intervalli di intervento almeno a due settimane, e dove la sanità delle uve è buona, anche oltre. Nelle zone precoci trattare esclusivamente con prodotti a base di rame (Airone, Coprantol, Idrorame o analoghi) aggiungendo ancora zolfo (in microgranuli come Tiospor o liquido come Thiopron, Heliosoufre, Tiolene ecc.) fino a che l'invasione non sia quasi completa. Nelle zone più tardive meglio invece usare Electis R o Daramun o altro prodotto a base di ciazofamide, con aggiunta di rame, e sempre con aggiunta di zolfo e nel caso anche di Vivando o Kusabi. Attenzione quest'anno per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR è stata rilasciata deroga per arrivare fino a 5 Kg/ha di rame, sempre nel rispetto dei 28 Kg in 7 anni. In questo momento non sono necessari trattamenti insetticidi di alcun tipo.

Melo

Si consiglia di ripristinare le coperture preferibilmente con captano a seconda dei dilavamenti. In questo periodo con precipitazioni scarse si possono allungare gli intervalli di

intervento minimo a 15-18 giorni ed oltre. La presenza di cimice al momento è bassa, non si consigliano interventi insetticidi. Analogamente non si rendono necessari altri trattamenti per carpocapsa. Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura amara.

Attenzione alla deriva dei trattamenti sulle Gala, che è prevista in inizio raccolta dopo ferragosto.