

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

**Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria**

**Comunicato di martedì 13 agosto 2024**

## **Vite**

Nelle ultime settimane, complice l'andamento meteo caldo secco, si è osservato un netto calo del rischio delle infezioni di peronospora. Il rischio di oidio è invece ancora medio alto a seconda delle zone e della precocità, anche se attualmente in calo. In queste condizioni si possono allungare gli intervalli di intervento almeno a due settimane, e dove la sanità delle uve è buona, anche oltre. Nelle zone precoci trattare con prodotti a base di rame (Airone, Coprantol, Idrorame o analoghi) aggiungendo zolfo (in microgranuli come Tiospor o liquido come Thiopron, Heliosoufre, Tiolene ecc.) fino a che l'invasatura non sia quasi completa. Nelle zone più tardive meglio invece usare Electis R o Daramun o altro prodotto a base di ciazofamide, con aggiunta di rame, e sempre con aggiunta di zolfi e nel caso anche di Vivando o Kusabi. Attenzione quest'anno per chi aderisce alla mis. 10.1 del PSR è stata rilasciata deroga per arrivare fino a 5 Kg/ha di rame, sempre nel rispetto dei 28 Kg in 7 anni. Si può aggiungere un prodotto a base di zeolite contro le scottature dei grappoli, e un concime fogliare a base di calcio.

## **Melo**

Si consiglia di ripristinare le coperture preferibilmente con captano a seconda dei dilavamenti. In questo periodo con precipitazioni scarse si possono allungare gli intervalli di intervento minimo a 15-18 giorni ed oltre. Nei frutteti e nelle aree marginali si osserva da

qualche giorno un incremento di osservazioni di **cimice asiatica**, e così anche nelle trappole. La fase, che è di passaggio dagli ultimi stadi giovanili a quello adulto, si presta ad un trattamento insetticida, che è consigliato anche perché con il protrarsi dell'andamento meteo siccitoso, le mele diventano molto appetibili per la cimice. Si consiglia di intervenire nel rispetto dei tempi di carenza, nei prossimi giorni in miscela con captano, **con Epik oppure Kestrel**, in pratica entro e non oltre il 20 di agosto. Prestare massima attenzione a non effettuare deriva sulle Gala, che dopo ferragosto saranno in fase di inizio raccolta.