

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 16 maggio 2025

Melo

Le infezioni primarie, almeno nelle zone basse, si possono ritenere concluse. In assenza di macchie di ticchiolatura su foglia si consiglia di ripetere i trattamenti dopo 7-8 giorni da quello precedente, ripristinando le coperture. Essendo previste precipitazioni per la prossima settimana, si consiglia pertanto di intervenire con una copertura (Delan, oppure Banyo o Nando) se questa settimana non sono stati effettuati trattamenti. Se si è trattato nei giorni scorsi per curare l'infezione della notte tra lunedì e martedì, al momento non si consiglia di trattare, ma è comunque meglio ripetere una copertura prima delle prossime infezioni. **In presenza invece di infezioni su foglia o frutto si consiglia di considerare ancora infettanti le prossime piogge e pertanto ripetere una copertura, e poi valutare i dilavamenti per decidere un ulteriore intervento curativo** (Score o revysion). Alternativa per chi ha infezioni su foglia o frutto: dodina, Syllit 65 WG.

Carpocapsa: i voli dell'insetto sono iniziati e anche le sommatorie termiche sono raggiunte, si consiglia di intervenire entro questo fine settimana-inizio della prossima nelle zone precoci utilizzando Coragen o prodotto analogo, nelle zone tardive anche metà-fine settimana prossima; per i biologici si consiglia di usare virus della granulosa in questi giorni, da ripetere dopo una decina di giorni. Effettuare l'insetticida in una giornata asciutta con tempo stabile.

Vite

Sono state segnalate macchie d'olio di peronospora in alcuni vigneti, e il rischio di infezioni in questa fase si mantiene medio elevato. Si raccomanda pertanto di ripetere gli interventi in base alla scadenza della persistenza di quello precedente, verificando le indicazioni di etichetta; in questa fase usare sistemici (Ridomil R, Ridomil con folpet, Actlet F, Folpan gold ecc., Electis trio, Zorvec vinabel o vinabria da ripetere dopo 12-14 giorni **e comunque non anticipando rispetto alle etichette**. In presenza significativa di macchie aggiungere **dimetomorf** (attenzione, utilizzabile **entro il 20 maggio**) oppure **cimoxanil**. Per l'oidio usare Topas (attenzione, a chi conferisce uve non è consentito), oppure Domark, Revysion, Folicur in miscela con 250-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido. In caso di presenza **Black rot** usare un sistemico a base di difenoconazolo (Score o simili), Revysion oppure Flint o Quadris. Anche folpet ha effetto collaterale su Black rot.