

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato mercoledì 21 maggio 2025

Vite

Da lunedì si segnala **una nuova evasione di macchie fresche di peronospora**; evidentemente siamo al termine del periodo di incubazione di un' infezione importante. Ci troviamo tra inizio e quasi piena fioritura a seconda delle zone, **pertanto siamo ancora in una fase di elevato rischio**; si raccomanda quindi di **usare ancora sistemici** ripetendo gli interventi in base alla scadenza della persistenza di quello precedente; con i sistemici si consiglia di stare a **12-14 giorni**, valutando in base alla presenza o no di malattia e all'andamento meteo. Formulati consigliati: Ridomil R, Ridomil con folpet, Actlet F, Folpan gold ecc., Electis trio, Zorvec vinabel o vinabria. In presenza significativa di macchie aggiungere **cimoxanil**. **DIMETOMORPH (Forum, Almada hydro, ecc.) NON E' PIU' UTILIZZABILE**. Per l'oidio usare Topas (attenzione, a chi conferisce uve non è consentito), oppure Domark, Revysion, Folicur in miscela con 250-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido. In caso di presenza **Black rot** usare un sistemico a base di difenoconazolo (Score o simili), Revysion oppure Flint o Quadris. Anche folpet ha effetto collaterale su Black rot.

Per i biologici, si raccomanda di ripristinare le coperture con rame a dosi che garantiscano un contenuto di almeno 30-40 g/hl, dopo massimo 30 mm di dilavamento, evitando di lasciare la vegetazione scoperta in previsione di precipitazioni; per l'oidio utilizzare un formulato a base di zolfo liquido o bagnabile, ed eventualmente zeolite.

Melo

Le infezioni primarie, almeno nelle zone basse, si possono ritenere concluse. In assenza di macchie di ticchiolatura su foglia/frutto si consiglia di ripetere i trattamenti dopo 7-8 giorni da quello precedente, ripristinando le coperture. In presenza di infezioni su foglia o frutto si consiglia invece di intervenire ancora con coprenti prima delle piogge, oppure con coprente più sistemico (Score o Revysion). Nelle zone più in quota/tardive fare ancora attenzione e ripetere i trattamenti eseguiti nel fine settimana, entro venerdì o sabato con coprente più sistemico. Alternativa per chi ha infezioni su foglia o frutto: dodina, Syllit 65 WG.

Carpocapsa: Se non si è ancora intervenuti, trattare con Coragen o prodotto analogo; per i biologici si consiglia di usare virus della granulosa da ripetere dopo una decina di giorni. Effettuare l'insetticida in una giornata asciutta con tempo stabile.