Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 / 513449
WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato venerdì 30 maggio 2025

Vite

In questa fase compresa tra inizio e fine fioritura si raccomanda di **usare ancora antiperonosporici sistemici** ripetendo gli interventi in base alla scadenza della persistenza di quello precedente senza allungarli; con i sistemici si consiglia di stare a **12-14 giorni**, valutando in base alla presenza o no di malattia e all'andamento meteo. Formulati consigliati: Ridomil R, Ridomil con folpet, Actlet F, Folpan gold ecc. Verso fine fioritura consigliati Zorvec vinabel o vinabria. In presenza significativa di macchie aggiungere **cimoxanyl. DIMETOMORPH (Forum, Almada hydro, ecc.) NON E' PIU' UTILIZZABILE.** Per l'oidio usare Topas (attenzione, a chi conferisce uve non è consentito), oppure Domark, Revysion, Folicur in miscela con 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido. Prossimamente a fine fiotitura sospendere l'uso dei sistemici. In caso di presenza **Black rot** usare un sistemico a base di difenoconazolo (Score o simili), Revysion oppure Flint o Quadris. Anche folpet ha effetto collaterale su Black rot.

Per i biologici, si raccomanda di ripristinare le coperture con rame a dosi che garantiscano un contenuto di almeno 30-40 g/hl, dopo massimo 30 mm di dilavamento, evitando di lasciare la vegetazione scoperta in previsione di precipitazioni; per l'oidio utilizzare un formulato a base di zolfo liquido o bagnabile, ed eventualmente zeolite.

Melo

Le infezioni primarie si possono ritenere concluse. In assenza di macchie di ticchiolatura su foglia/frutto si consiglia di ripetere i trattamenti ripristinando le coperture dopo 30-40 mm di dilavamento e in presenza di rischio di precipitazioni. Prodotti utilizzabili, quelli a base di fluazinam (Banjo, Nando ecc.), attenzione ai tempi di carenza su Gala (60-63 giorni a seconda dei prodotti). In presenza di infezioni su foglia o frutto: dodina, Syllit 65 WG.

Carpocapsa: Se si è effettuato il trattamento con Coragen a inizio mese, al momento non si rendono necessari interventi; in caso di applicazione dei diffusori del disorientamento, applicarli a partire dal 15-20 giugno. Per i biologici raccomandato l'uso di virus della granulosi (Madex ecc.).