

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 23 luglio 2025

Vite

A seguito dell'abbassamento delle temperature e dei piovoschi dei giorni scorsi è comparsa una grande quantità di **macchie di peronospora sulle femminelle**, in parte anche sporulate. Occorre fare attenzione, e nel caso siano molto colpite, tagliare le femminelle. Contemporaneamente si consiglia di mantenere la copertura della vegetazione trattando non oltre i 14 giorni, e dopo 25-30 mm di dilavamento nel caso di uso di solo rame. Meglio utilizzare ancora un prodotto come Pergado SC + rame, oppure Mildicut o altro prodotto contenente ciazofamide (Daramun, Manamid, Back ecc.) + rame, zoxamide+rame (Electis R) oppure fluazinam (Banjo, Nando maxi).

Per quanto riguarda l'oidio la situazione appare buona, e non ci sono stati segnalati nuovi casi di infezioni di black rot. Per l'oidio usare zolfo bagnabile o liquido e Vivando o simili, oppure Kusabi, o Cidely che ha attività parzialmente bloccante.

Tignoletta: nei vigneti di Berbenno e Buglio in Monte in particolare ci sono problemi di tignoletta; nonostante i trattamenti insetticidi e in qualche caso l'applicazione della confusione si vedono danni agli acini; in questo momento inutile trattare, si consiglia di aspettare l'inizio della terza generazione ed effettuare un insetticida specifico. Daremo ulteriori indicazioni in merito.

Melo

Fare attenzione alle infezioni di ticchiolatura, quest'anno piuttosto diffuse, e ripristinare le coperture dopo 40-50 mm massimi di dilavamento e in presenza di rischio di precipitazioni. Prodotti utilizzabili, per la maggior parte delle linee di difesa quelli a base di Captano, **ma occorre rifarsi alle indicazioni di chi ritira le mele**. Per chi usa captano, essendo la carenza di 21 giorni, trattando in questi giorni sarà l'ultimo intervento su Gala.

In caso di problemi di **afide lanigero** effettuare **lavaggi con saponi molli di potassio (Flipper ecc.)**, bagnando bene la vegetazione a volume normale. In qualche caso si vede una buona parassitizzazione dell'afelino.

Carpocapsa: in alcuni frutteti trattati poco in questi giorni si osserva volo dell'insetto e rosure fresche; se ci sono stati danni lo scorso anno intervenire con un insetticida perché in questo momento ci può essere penetrazione delle larve nel frutto. Consigliati: Affirm oppure Delegate (ultimo anno di utilizzo) o Trebon. Confrontarsi prima con il servizio tecnico di riferimento.

Cimice asiatica: si è osservata nei giorni scorsi presenza di stadi giovanili di cimice asiatica; in caso di presenza di danni importanti lo scorso anno, si raccomanda di controllare frequentemente i frutteti, e in caso di necessità eseguire un trattamento con Decis oppure Trebon, che possono essere efficaci anche su carpocapsa. Confrontarsi prima con il servizio tecnico di riferimento.

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura.