

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 6 agosto 2025

Vite

Attualmente la vite si trova tra l'inizio e circa il 50% dell'invasatura; con il completarsi di tale fase e l'indurimento dei tralci cala notevolmente la sensibilità alla peronospora e all'oidio; per i trattamenti si consiglia, nelle zone in ritardo con la fase fenologica, di utilizzare ancora Pergado SC + rame oppure zoxamide + rame (Electis R oppure zoxium + rame), e per l'oidio Flint o Vivando con zolfo. Dove invece l'invasatura è più avanti si può passare ad usare solo un prodotto a base di rame (ossicloruro, idrossido o solfato), e zolfo bagnabile o liquido. Aggiungere eventualmente un concime a base di calcio.

Tignoletta: soprattutto nei vigneti di Berbenno e Buglio in Monte, ma in modo sporadico anche in sassella e zona Chiuro ci sono problemi di tignoletta; al momento siamo verso la fine della seconda generazione e a breve ci attendiamo un possibile inizio di terza; solo nelle zone dove la seconda generazione ha colpito in modo più significativo si consiglia di intervenire la prossima settimana, indicativamente tra il 12 e il 15 agosto, con un trattamento con Coragen o Voliam, a base di clorantraniliprole, onde evitare danni in maturazione.

Melo

Dopo 30 -40 mm di pioggia effettuare una copertura con Captano; attenzione, su Gala non c'è più margine per fare trattamenti, tranne dove si usa Bellis (7 giorni di carenza) o Geoxe (3 giorni di carenza). Su Gala si possono comunque sospendere i trattamenti.

Carpocapsa: mediamente la situazione al momento è buona, nel senso che nei frutteti trattati regolarmente non ci sono catture e non si vedono rosure; in alcune situazioni, specialmente nei frutteti trattati poco, o in prossimità di questi, si nota una presenza maggiore; in caso di necessità, dopo la raccolta delle Gala, nelle zone critiche si può effettuare un trattamento con Affirm o Delegate (per entrambi 7 giorni di carenza).

Cimice asiatica: al momento non si consigliano interventi; dopo la raccolta delle Gala, specialmente nelle zone dove si sono visti danni anche negli anni scorsi, o si è già notata una presenza di cimice, si può valutare un intervento con deltametrina (Decis ecc.)

Aggiungere un concime a base di calcio per la butteratura.