

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 5 settembre 2025

Vite

In questa fase si consiglia di effettuare un prodotto a base di rame come Idrorame, Cuproxat, Airone, Poltiglia disperss o Bordoflow. I prodotti a base rame hanno di norma 20 giorni di carenza su vite, tranne alcuni come Poltiglia disperss che hanno 7 giorni. Nelle situazioni in cui le uve tendono a scoppiare o ci sono comunque lesioni della buccia, si consiglia di effettuare l'antibotritico (esempi di carenze Switch e Kenja 21 giorni, Prolectus 14 giorni, teldor 7 giorni). Per maggiori informazioni vedere il Notiziario tecnico sugli antibiotritici.

Rapportarsi comunque con le cantine a cui vengono conferite le uve per le tipologie di formulati da usare. Effettuare pulizia sulla fascia grappolo e tenere bassa l'erba.

Melo

Sulle varietà tardive come Fuji, Granny Smith, Pink Lady, dopo 30-35 mm di pioggia si consiglia di ripetere un intervento a base di captano (20 giorni di carenza); chi non ha problemi di limiti di residui, può usare eventualmente anche Bellis (7 giorni di carenza) oppure Geoxe (3 giorni di carenza). Attenzione a non fare deriva sulle varietà rosse sulle Golden ormai prossime all'inizio raccolta.

Cimice: nelle ultime due settimane ci sono state numerose segnalazioni di presenza di cimice nei frutteti, sia di cimice asiatica, ma soprattutto cimice verde (*Nezara viridula*). Se in fase di

raccolta delle varietà rosse o delle Golden, si notano segni significativi di danni da cimice, si consiglia di effettuare un trattamento insetticida con Decis o altro piretroide sulle varietà tardive (Fuji, Granny, Pink lady); il trattamento risulta efficace soprattutto sugli stadi giovanili. Attenzione a dove l'erba è alta, questa risulta vantaggiosa soprattutto per la cimice verde. Si consiglia quindi di tenere l'erba bassa; tagliare l'erba quando ormai è alta può causare improvviso passaggio delle cimici dall'erba alle mele. Attenzione alle zone di bordo e alla vicinanza con gli incolti, effettuare controlli frequenti per valutare la situazione.