

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954

- in orario ufficio: alla risposta digitare 3

- fuori orario ufficio: ascolto diretto

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE VOLI DELLA CIMICE

Per quanto riguarda la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), quest'anno si osserva un accavallamento delle generazioni maggiore che nelle ultime annate; molto probabilmente c'è stato anche un leggero ritardo della generazione estiva. Da qualche giorno si osserva inoltre un aumento di presenza stadi giovanili (in particolare stadio 4 e 5), sia nelle trappole che sulla frutta, specialmente nelle zone di bordo.


Contestualmente si è osservata anche, praticamente per tutta l'estate, una presenza non indifferente di cimice verde (*Nezara viridula*), una specie che in passato risultava dannosa soprattutto su orticole, e in particolare pomodoro. Da quando è presente la cimice asiatica, si è notato però un aumento di questa specie, sia delle popolazioni in campo, sia della sua pericolosità per le mele, in quanto causa danni analoghi a quelli di cimice asiatica. Questo era stato evidenziato già qualche anno fa, sia in provincia di Sondrio sia in frutteti di altre zone del nord Italia. In particolare, la cimice verde analogamente ma forse ancor più di quella asiatica, staziona di preferenza sull'erba per poi portarsi sulle mele, e questo è dimostrato dagli abbondanti esemplari che si sollevano in volo quando i macchinari entrano nei filari con l'erba alta.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione in questa fase, sulle varietà tardive (Fuji, Granny Smith, Pink Lady ecc.) in quanto è possibile in concomitanza con la presenza di stadi

giovanili molto elusivi, ma anche in contemporanea di adulti, che possano aumentare i danni su queste varietà; se la presenza è abbondante e/o si sono visti danni particolarmente elevati sulle varietà che si stanno raccogliendo, si raccomanda di effettuare controlli su quelle ancora da raccogliere ed eventualmente intervenire con un piretroide, compatibilmente con i tempi di carenza. Prima di effettuare interventi confrontarsi comunque con il soggetto che ritira le mele.

Per un approfondimento sulla cimice verde:

<https://www.agraria.org/entomologia-agraria/cimice-verde.htm>



Fondazione Fojanini di Studi Superiori, 19 settembre 2025